1. **Vitamin B6 5mg + magnesi lactat 470mg (Magnesi-B6)**

Dạng bào chế: Viên nén bao phim

Thành phần:

Magnesi lactate dihydrat 470mg

Pyridoxin hydroclorid 5mg

Tá dược: tinh bột ngô, PVP K30, talc, acid stearic, HPMC E5, titan dioxyd, PEG 6000, Ethanol 96%, nước, vừa đủ 1 viên

Chỉ định:

- Điều trị các trường hợp thiếu magnesi nặng, riêng biệt hay kết hợp. Khi có thiều calcium đi kèm, đa số trường hợp phải bù magnesi trương khi bù calcium.
- Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu đi kèm với tăng lưu thông khí (còn **được** gọi là tạng co giật) khi chưa có điều trị đặc hiệu

Chống chỉ định:

Suy thận nặng với độ thanh thải của Creatinin dưới 30ml/phút.

Liều dùng, cách dùng:

Liều dùng:

Người lớn:

Thiều magnesi nặng: 6 viên/ngày

Tạng co giật: 4 viên/ngày

Trẻ em: 1-3 viên tùy theo tuổi.

Cách dùng: nên chia liều 2-3 lần, mỗi lần nên uống với nhiều nước

2. Vitamin A 2500UI+ D 250UI (Vitamin A-D)

Dạng bào chế: Viên nang mềm

Thành phần:

Mỗi viên nang mềm chứa:

Vitamin A (Retinyl palmitat) 25001U

Vitamin D (Cholecolciferol) 250IU

Tá dược vd viên

(Tá dược gồm: Dầu dậu nành, butylated hydroxytoluen, nipagin, mipasol, gelatin, glycerin, acid benzoic nude tinh khiết).

Chỉ định:

Bổ sung Vitamin A và D trong một số trường hợp như trẻ em còi xương chậm lớn, bệnh khô mắt, quáng gà.

Chống chỉ định:

- Người bị quá mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
- Người bệnh thừa vitamin A.
- Tăng calci máu hoặc nhiễm độc vitamin D.

Liều dùng, cách dùng:

- Người lớn: Uống ngày 1-2 viên
- Trẻ em: Uống tuỳ theo tuổi theo sự chỉ dẫn của thầy thuốc.

3. Vitamin E 400mg (Incepavit 400 Capsule)

Dạng bào chế: Viên nang cứng

Thành phần:

DI-Alpha-tocopheryl acetat: 400 mg.

Tá dược: Gelatin, Polyorbat 80, Orange lake.

Chỉ định:

Dùng dự phòng và điều trị thiếu vitamin E.

Vitamin E cũng được dùng làm thuốc chống oxy hóa.

Chống chỉ định:

Không có.

Liều dùng, cách dùng:

Dự phòng và điều trị thiếu vitamin E hoặc chống oxy hóa: Liều đề nghị là 1 viên nang/ngày cùng hoặc sau bữa ăn hoặc theo kê toa của bác sĩ.